



Créé en 1992, l'Observatoire Ostréicole suit des lots d'huîtres naturelles sur **14 parcs du littoral charentais** (12 dans le Bassin de Marennes-Oléron et 2 sur l'Île de Ré) dans des conditions d'élevage représentatives des pratiques professionnelles locales. Captés sur coupelles par le CAPENA sur le site des Longées, les lots sont placés sur les parcs en mars/avril de chaque année (2025 : semaine 11) et élevés pendant 3 ans. Un suivi saisonnier de la **mortalité** et de la **croissance** (gain de poids), ainsi qu'un bilan annuel (fin d'année) sont réalisés sur les lots des trois classes d'âge.

Les résultats ci-dessous représentent l'état des performances des lots à la **fin de l'été 2025** et sont issus des derniers échantillonnages réalisés le 25/09/2025 dans le **Bassin de Marennes-Oléron** et dans l'**Île de Ré**.

Tableau 1 : Taux de mortalité (%) ; moyenne) et croissance pondérale (g ; moyenne) des lots d'huîtres de 1^{ère}, 2^{ème} et 3^{ème} année obtenus à la fin de l'été 2025 (valeurs en gras). Les valeurs de référence correspondent à la moyenne de 31 années de suivi pour les huîtres de 1^{ère} année (1994-2024) et de 25 années de suivi pour les huîtres de 2^{ème} et 3^{ème} année (2000-2024). Les flèches représentent l'évolution des tendances actuelles par rapport aux valeurs de référence à la même période.

	Mortalité		Croissance	
1^{ère} année sur parcs de demi-élevage	55,3 % (Référence = 53,7 %)	⇒	+14,6 g (Référence = +12,2 g) Poids individuel = 15,1 g	↗
2^{ème} année sur parcs de demi-élevage	16,4 % (Référence = 14,2 %)	↗	+19,5 g (Référence = +19,3 g) Poids individuel = 36,2 g	⇒
3^{ème} année sur parcs de pousse	9,3 % (Référence = 15,1 %)	↘	+27,3 g (Référence = +22,1 g) Poids individuel = 61,0 g	↗

I. Mortalité

Au mois de septembre 2025, les mortalités des lots de **1^{ère} année** sont légèrement supérieures à la valeur de référence acquise depuis 30 ans (55,3 % en 2025 contre 53,7 % en référence). Les pertes restent toutefois du même ordre de grandeur que celles observées l'année précédente (54,0 % en 2024). Le parc de **La Mortane** a été le plus touché pour cette classe d'âge, avec **74 %** de pertes. Le parc de **La Flotte** présente également une mortalité élevée (**71 %**). Les parcs de **Bourgeois (65 %)**, **Chevalier (56 %)**, **Boyard (55 %)** et **Viandet (52 %)** enregistrent des mortalités supérieures à 50 %. Les parcs de **Martray (49 %)** et **Ronce (49 %)** affichent des valeurs proches de 50 %, tandis que **Mérignac** conserve la meilleure survie pour cette classe avec **27 %** de pertes.

Pour les huîtres de **2^{ème} année**, les mortalités cumulées atteignent **16,4 %**, soit un niveau légèrement supérieur à la valeur de référence historique (14,2 %) et supérieur à celui observé en 2024 (14,6 %). Les parcs les plus affectés sont **La Flotte (42 %)** et **Bourgeois (35 %)**. Les

parcs **Viandet (14 %)**, **Martray (13 %)**, **Chevalier (11 %)** et **Mérignac (10 %)** se situent autour de 10–15 %, tandis que **La Mortane (8 %)**, **Boyard (6 %)** et **Ronce (5 %)** présentent des mortalités relativement faibles en seconde année.

Concernant les huîtres de **3^{ème} année**, les mortalités cumulées sont en nette baisse par rapport à 2024 (**9,3 %** en 2025 contre **17,8 %** en 2024) et restent inférieures à la moyenne de référence (15,0 %). Ces huîtres, déplacées sur les parcs de pousse début juillet, ont présenté des taux de perte mesurés à la fin de l'été de **13 %** à **La Casse**, **9 %** à **Lamouroux** et **6 %** à **la Coupe à Colleau**.

II. Croissance

L'été 2025 est caractérisé par des croissances globalement conformes ou supérieures aux valeurs de référence, avec des variations marquées selon les sites.

La **croissance des huîtres de 1^{ère} année** est en moyenne de **+14,6 g** (référence = +12,2 g ; 2024 = +14,0 g). Les parcs les plus performants sont **La Mortane (+21 g)**, **Ronce (+18 g)** et **Chevalier (+15 g)**. Les gains les plus faibles ont été mesurés à **Mérignac (+11 g)**, **Boyard (+12 g)** et **Bourgeois (+13 g)** ; **La Flotte** affiche un gain intermédiaire de **+13 g**. Le poids individuel moyen des huîtres de 1^{ère} année est de **15 g**, proche de la valeur de 14 g enregistrée l'année précédente.

Les **huîtres de 2^{ème} année** présentent une croissance moyenne de **+19,5 g** (référence = +19,3 g ; 2024 = +20,2 g). Les meilleurs gains sont observés sur **La Mortane (+26 g)**, **Chevalier (+26 g)** et **Ronce (+25 g)**. **La Flotte** connaît un gain élevé de **+22 g**, tandis que **Viandet** et **Boyard** affichent respectivement **+18 g** et **+19 g**. **Mérignac** reste le moins performant en seconde année avec **+9 g**. Le poids individuel moyen atteint **36,2 g** à la fin de l'été.

Enfin, les **huîtres de 3^{ème} année** confirment une bonne dynamique de pousse, avec une croissance moyenne de **+27,3 g** (référence = +21,9 g ; 2024 = +28,2 g). Les parcs de pousse affichent des gains de **+29 g** à **la Coupe à Colleau**, **+28 g** à **La Casse** et **+24 g** à **Lamouroux**. Le poids individuel moyen de ces lots s'établit à **61,0 g** à la fin de l'été 2025.

Remerciements : Nous remercions les professionnels partenaires, le Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle et le Lycée de la Mer de Bourcefranc qui nous prêtent des emplacements sur leurs parcs. Le Lycée Maritime et Aquacole de La Rochelle entretient les élevages et réalise les échantillonnages sur l'île de Ré.

*Citation : **Barbier P**, Barré M, Bodin P, Oudot G (2025) Observatoire Ostréicole du littoral charentais – Bulletin saisonnier n°2 – Été 2025. CAPENA, 2p.*